



Entzündungsszintigraphie - Anti-Leukozytenszintigraphie

Anwendungsgebiete:

- Fieber unklarer Genese
- V. a. Osteomyelitis
- Endokarditis
- Protheseninfektion (z.B. Gefäß- oder Gelenkprothesen)
- Abdominelle Entzündungen, abgesehen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Harnwegsinfektionen

Kontraindikationen:

- Schwangerschaft (relative Kontraindikation) und in der Stillzeit strenge Indikationsstellung (Unterbrechung für 48 h)
- Erhöhte HAMA-Antikörper durch vorangegangene Untersuchungen bzw. Antikörpertherapien mit Maus-Antikörpern

Vorbereitung:

- Sämtliche Medikamente können eingenommen werden.
- Während der Untersuchungsdauer besteht eine Wartezeit von mehreren Stunden.
- Stationäre Patienten sollten ein Lunch-Paket mitbringen und „normale“ Bekleidung, z. B. einen Trainingsanzug, zumindest aber einen Bademantel. Wenn vorhanden, sollte eine Lesebrille mitgegeben werden, damit die Patienten in der Wartezeit lesen können. Zwischenzeitlich ggf. notwendige Medikamente (wichtig: Schmerzmittel, Insulin) sollte der Patient sicherheitshalber mitbringen.

Untersuchungsdauer: 6-8 Stunden, ggf. Aufnahmen am Folgetag